



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

TESTE SELETIVO – 003/2023
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CANDIDATO: _____

1. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil que terminou em 1916. Essa guerra teve início no ano:

- a. () 1912
- b. () 1915
- c. () 1913
- d. () 1916

2. Com o objetivo de defender os interesses dos municípios da região e servir de canal para as reivindicações dos municípios filiados junto as outras esferas do governo, em junho de 2007 teve origem um bloco de grande representatividade técnica e política no planalto norte. Como é chamado esse bloco?

- a. () AMPLANORTE
- b. () AMUNESC
- c. () AMURC
- d. () AMARP

3. A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil é proveniente de:

- a. () Hidroelétricas
- b. () Parques eólicos
- c. () Termoelétricas
- d. () Termonucleares

4. Segundo IBGE, a população estimada de Major Vieira em 2021, era:

- a. () 7.750 habitantes
- b. () 8.209 habitantes
- c. () 7.479 habitantes
- d. () 8.570 habitantes



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

5. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) deflagram desde o final do ano de 2022, a Operação Mensageiro. Essa operação apura:

- a. () Suspeita de fraude em pregão eletrônico, organização criminosa e roubos em postos de gasolina em toda Santa Catarina.
- b. () Suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina.
- c. () Trata-se de um conjunto de investigações que cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina em setores do transporte.
- d. () Investigação que suspeita de lavagem de dinheiro em portos de Santa Catarina, provenientes de negociações internacionais de contrabando e troca de informações entre facções poderosas.

6. Segundo o portal de turismo de Major Vieira, fazem parte da história do município, povos italianos, alemães e ucranianos, porém, Major Vieira é um núcleo de colonização predominantemente:

- a. () Polonesa
- b. () Alemã
- c. () Russa
- d. () Sírio-Libaneses

7. De acordo com a Folha de São Paulo (2023), a Ucrânia entrou em Guerra no dia 24 de fevereiro de 2022 com qual país?

- a. () Inglaterra
- b. () Estados Unidos
- c. () Índia
- d. () Rússia



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

8. O Brasil realiza seu mais novo censo demográfico em 2022/2023. O Censo é realizado pelo IBGE e é essencial para o planejamento de políticas públicas. No Brasil, a Constituição de 1988 e a Lei n. 8.184/91 estipulam a realização decenal do recenseamento, fazendo com que ele sirva de âncora essencial para o planejamento por parte do Estado. A sigla IBGE significa:

- a. () Índice Brasileiro de Grandes Estatísticas
- b. () Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- c. () Instituição do Brasil para Gastos Econômicos
- d. () Instituto Brasileiro de Geologia e Economia

9. A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina é atualmente representada e coordenada por:

- a. () Rosa Maria Pires Weber
- b. () Renata Dallposso de Azevedo
- c. () Ana Campagnolo
- d. () Carmen Zanotto

10. Qual das alternativas contém os números aproximados de casos e de óbitos de Covid-19, acumulados no Brasil, até a semana epidemiológica 10/2023, de acordo com o Ministério da Saúde?

- a. () 35 milhões de casos e 106 mil óbitos
- b. () 135 milhões de casos e 689 mil óbitos
- c. () 200 milhões de casos e 689 mil óbitos
- d. () 37 milhões de casos e 699 mil óbitos

11. De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a rubéola é uma doença exantemática aguda que apresenta alta contagiosidade. Em relação à rubéola, assinale a alternativa incorreta:

- a. () O período de incubação da rubéola varia de 12 a 23 dias, durando em média 17 dias, a transmissibilidade é de aproximadamente de 7 dias antes do início do exantema e de 7 dias após o aparecimento do exantema;



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

b. () O agente infeccioso da rubéola é um vírus, pertencente ao gênero Rubivírus. A transmissibilidade é de aproximadamente de 10 a 15 dias antes do início do exantema e de 10 a 15 dias após o aparecimento do exantema e o quadro clínico é caracterizado por exantema maculo-papular e puntiforme difuso, iniciando-se na face, tronco e membros.

c. () A identificação do vírus da rubéola pode ser realizada, entre outros, por meio da urina, secreções nasofaríngeas e sangue, e a suscetibilidade é geral. A imunidade ativa é adquirida através da infecção natural ou por vacinação, permanecendo por quase toda a vida.

d. () O quadro clínico da rubéola é caracterizado por febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular e/ou occipital e/ou cervical, independentemente da idade e da situação vacinal;

12. De acordo com a Lista de Doenças de Notificação Compulsória do Ministério da Saúde, as respectivas alternativas abaixo apresentam agravos de notificação compulsória, exceto:

- a. () Toxoplasmose e Rubéola
- b. () Leptospirose e Poliomielite
- c. () Dengue e Síndrome do Corrimento Feminino
- d. () Peste e Febre amarela

13. De acordo com o Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas para a Hanseníase/MS, o tratamento medicamentoso na hanseníase (poliquimioterapia - PQT), é definido de acordo com a classificação operacional de cada caso. Essa classificação é fundamental para selecionar o esquema de tratamento adequado. Em relação ao tratamento PQT, escolha a opção correta:

- a. () O esquema terapêutico em caso paucibacilar adulto é de uma dose mensal de Rifampicina de 600 mg e uma dose diária de 100 mg de Dapsona com duração de 10 semanas;
- b. () O esquema terapêutico em caso paucibacilar em crianças é de uma dose mensal de Rifampicina de 400 mg e uma dose mensal de dapsona 50 mg, e mais uma dose diária de dapsona 50 mg.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

c. () No caso multibacilar em adulto, deve-se administrar Rifampicina em uma dose mensal de 600 mg, dapsona em uma dose mensal de 100 mg e mais uma dose diária de 100 mg, e clofazimina em uma dose mensal de 300 mg e mais uma dose diária de 50 mg, com 12 doses de duração.

d. () Em caso multibacilar em crianças, o tratamento será realizado com rifampicina (RFM), dapsona (DDS) e clofazimina (CFZ). As doses devem ser ajustadas de acordo com o peso da criança em proporções: RFM (15 a 25 mg/kg), DDS (1,0 mg/kg) e CFZ (5 mg/kg).

14. A raiva é uma Antropozoonose, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letal. Sua transmissão se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e, mas raramente pela arranhadura e lambadura de mucosas. O período de incubação é extremamente variável, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no homem e de 10 dias a dois meses no cão. Em relação ao esquema para profilaxia da raiva humana com vacina cultivo celular, segundo a DIVE – Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SC, é correto afirmar:

a. () Nos casos de acidentes leves (ferimentos superficiais, únicos), com animais sem suspeita de raiva no momento da agressão, deve-se lavar o ferimento com água e sabão, observar o animal durante dez dias e iniciar o tratamento com duas doses da vacina anti-rábica, uma no dia zero e a outra no dia três.

b. () Nos casos de acidentes leves (ferimentos superficiais, únicos), com animais sem suspeita de raiva no momento da agressão, deve-se lavar o ferimento com água e sabão, observar o animal durante dez dias, notificar e iniciar o tratamento com três doses da vacina anti-rábica, uma no dia zero, outra no dia três e outra no dia sete.

c. () Nos casos de acidentes leves (ferimentos superficiais, únicos), com animais sem suspeita de raiva no momento da agressão, deve-se lavar o ferimento com água e sabão, observar o animal durante dez dias e se o mesmo permanecer sadio neste período, encerrar o caso.

d. () Nenhuma das alternativas está correta.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

15. Na Hanseníase, a investigação tem o objetivo de romper a cadeia epidemiológica da doença, procurando identificar a fonte de contágio do doente, e descobrir novos casos. De acordo com o Ministério da Saúde, considera-se como contato intradomiciliar:

- a. () Toda e qualquer pessoa que resida, ou tenha residido com o doente, sendo da família ou não, nos últimos oito anos anteriores ao diagnóstico da doença.
- b. () Toda e qualquer pessoa que resida, ou tenha residido com o doente, sendo da família ou não, nos últimos cinco anos anteriores ao diagnóstico da doença.
- c. () Toda e qualquer pessoa que resida com o paciente durante a instalação da doença.
- d. () Toda e qualquer pessoa que resida, ou tenha residido com o doente, nos últimos 12 meses.

16. Em relação ao manejo adequado do paciente, indicado pelo Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Santa Catarina, assinale a sequência correta:

I. No Plano A, aumenta-se a ingestão de líquidos, orienta-se a utilização de sais de reidratação oral (SRO), e se mantém a alimentação habitual;

II. No plano B, o tratamento refere-se, à administração contínua de sais de reidratação oral (SRO), inicialmente em pequenos volumes e aumento da oferta e da frequência aos poucos. A quantidade a ser ingerida dependerá da sede do paciente, mas deve ser administrada continuamente até que desapareçam os sinais da desidratação;

III. No plano A, inicia-se o tratamento imediato com sais de reidratação oral e modifica-se a dieta para leve.

IV. No plano C, em alguns casos (perda de peso após duas horas de tratamento oral, de vômitos persistentes, entre outros), o uso de sonda nasogástrica é indicado;

V. A partir do Plano B, faz-se necessário iniciar um tratamento com antibiótico e anti-diarréico concomitantemente.

- a. () I, III estão corretas



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

- b. () I, II e IV estão corretas
- c. () II, III e V estão corretas
- d. () I e II estão corretas

17. A vacina dupla adulto – dT, é uma vacina fabricada com produtos de bactérias e contém toxóide diftérico e toxóide tetânico, e a vacina tríplice bacteriana acelular protege contra a difteria, tétano e coqueluche. São aplicadas por via intramuscular e na gestante é realizada para a proteção da própria gestante e para a prevenção do tétano no recém-nascido. Em relação a estas vacinas, pode-se afirmar:

- a. () Mulheres grávidas, não vacinadas, precisam receber pelo menos uma dose da vacina dT durante a gravidez, sendo que esta deve ser recebida pelo menos cinco dias antes da data provável do parto, para poder proteger o bebe contra o tétano neonatal.
- b. () Mulheres grávidas, vacinadas com o esquema completo anteriormente, deverão receber uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de cada gestação.
- c. () Mulheres grávidas, com esquema vacinal completo há dois anos anterior, não precisam receber nenhuma dose da vacina pois estão dentro do prazo de imunização dessa vacina.
- d. () Mulheres grávidas, não vacinadas, precisam receber duas doses da vacina dTpa durante a gravidez, sendo que a segunda dose deve ser recebida pelo menos vinte dias antes ou mais da data provável do parto.

18. De acordo com o Caderno de Atenção Básica 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, vários são os tipos e as causas de demência. Elas podem ser classificadas em reversíveis e irreversíveis. Entre os tipos mais comuns de demência irreversíveis na pessoa idosa, escolha a opção descrita corretamente:

- a. () A doença de Alzheimer tem início insidioso, perda de memória e declínio cognitivo lento e progressivo. Apresenta aspectos neuropatológicos e neuroquímicos característicos e fatores como hipertensão arterial, diabetes,



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

processos isquêmicos cerebrais e dislipidemia podem estar associados a doença. Fatores genéticos e a idade são irrelevantes.

b. () As demências vasculares têm início lento, geralmente com deterioração em degraus e flutuação do déficit cognitivo. Apresenta sinais focais, de acordo com a região cerebral acometida.

c. () As demências dos corpúsculos de Lewy apresentam características como flutuação na cognição, alucinações visuais recorrentes bem formadas e parkinsonismo precoce.

d. () As demências frontotemporais (doença de Pick), têm início somente a partir de 70 anos, com apresentação de mudanças na personalidade e no comportamento e/ou alteração da linguagem como características iniciais bem marcantes. O comprometimento da memória ocorre desde o início do quadro.

19. A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O agente etiológico da enfermidade é o *Mycobacterium tuberculosis*. Tratando-se de tuberculose, assinale a questão incorreta de acordo com Ministério da Saúde/2022:

a. () A TB é uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, pelo espirro ou pela fala de pessoas com TB pulmonar ou laríngea.

b. () A suscetibilidade à infecção é praticamente universal, no entanto a maioria dos infectados resiste ao adoecimento após a primoinfecção e desenvolve imunidade parcial à doença. Os bacilos ficam encapsulados, em estado latente, em pequenos focos quiescentes que não progridem, nem provocam o adoecimento.

c. () O adoecimento por TB confere imunidade contra novas infecções evitando recidivas da doença. A vacina disponível, bacilo de Calmette-Guérin (BCG), também previne o adoecimento pela forma pulmonar mesmo em formas leves.

d. () A forma pulmonar, além de mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença.

20. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. De acordo com o Ministério da saúde, fazem parte das PICS:

- a. () Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura e Homeopatia
- b. () Plantas Medicinais e Fitoterapia e Termalismo Social/Crenoterapia
- c. () Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki e Ozonioterapia
- d. () Todas as alternativas anteriores